

# Noyades en Nouvelle-Écosse 2024

Bilan des noyades et mesures de prévention


## Noyades mortelles et non mortelles<sup>1</sup>

**Noyade** - « Insuffisance respiratoire due à la submersion ou à l'immersion dans un liquide »

**Noyade non mortelle** - Noyade arrêtée avant la mort.

Au cours des 10 dernières années, **96,5 %** des noyades traumatiques en Nouvelle-Écosse ont été **mortelles**.

## Qui et Quand?



19%

Femmes



81%

Hommes

Âge: 0-19

14.5%

Âge: 20-59

50%

Âge: 60+

35.5%

66% Avril à Septembre

\*Pourcentage pour le nombre total de noyades


## Où?

Plans d'eau naturels:  
**77%**

Plages, cours d'eau et lacs

Bassins artificiels  
**23%**

Baignoires, piscines, etc.




\* Pourcentages pour les noyades des données disponibles.




## Causes des noyades

\* Pourcentage pour les noyades où les données étaient disponibles.

Les données recueillies en Trauma Nouvelle-Écosse (2013-2023)



# ⚠ Signes de noyade<sup>2-4</sup>



**Remarque :** Les jeunes enfants et les bébés sont différents, ils coulent<sup>3</sup>

**Corps vertical, pas de déplacement**

**Visage vers le ciel, regard paniqué, recherche de l'air**

**Les bras poussent vers le bas**

**Incapable de demander de l'aide**

**Monte et descend à la surface de l'eau**

## 🚶 Que faire pour aider?<sup>3, 5-7</sup>

- ➔ Reconnaître le danger et agir rapidement
- ➔ Appeler à l'aide
- ➔ Encouragez à « se retourner, flotter et se déplacer » vers la sécurité<sup>5, 6</sup>
- ➔ Suivre des cours de RCR et de sauvetage aquatique



## Prévention des Noyades<sup>7-12</sup>

\*GS = gilet de sauvetage

**Surveiller attentivement les enfants...  
À portée de bras**

**Ne jamais nager seul**

**Apprendre à nager**

**d'alcool avant de nager ou faire du bateau**

**Porter un GS\* bien ajusté**

**Connaître les dangers du lieu de baignade**

**Personne n'est jamais trop prudent !**

**Vous voulez en savoir plus?**

**Scannez-moi** ➔



**TRAUMA NOVA SCOTIA**



**Remerciements:**  
Les données utilisées dans cette recherche ont été fournies par le Programme de Trauma de la Santé Nouvelle-Écosse (Nova Scotia Health Trauma Program). Les opinions exprimées par les auteurs ne reflètent pas nécessairement celles du Programme de Trauma de la Santé Nouvelle-Écosse (Nova Scotia Health Trauma Program).